

Productomschrijving

Principelle IF[®] is een steriele wondzalf met een formulering van spoorelementen en boekweithoning. Mineralen en spoorelementen zijn rechtstreeks vermengd met donkere boekweithoning, geschikt voor medische toepassing.
De formulering wordt geleidelijk opgenomen door het wondoppervlak. Principelle IF[®] kan gebruikt worden op alle wondtypen. Tube verpakking speciaal geschikt voor gebruik in diepe wonden.

Product-eigenschappen

Onder supervisie van een zorgprofessional kan Principelle IF[®] worden toegepast bij de behandeling van gecontamineerde en geïnfecteerde acute- en chronische wonden, met inbegrip van brandwonden. Ook caviteiten kunnen worden opgevuld met Principelle IF[®]. Principelle IF[®] dient met een secundair verband te worden afgedekt. Afhankelijk van de mate van exsudaat wordt een absorberend verband aanbevolen. Denk hierbij aan een traditioneel absorberend verband of Principelle Matrix[®]. Sterk exsuderende wonden verkorten de draagtijd.
Principelle IF[®] normaliseert het micro-milieu van de wond door herstel van de protease balans en regulering van bacteriële contaminatie en ontsteking in stagnerende wonden. Dit bevordert de mogelijkheid tot vorming van granulatie-weefsel en nieuw epitheel. Proteasen spelen een belangrijke rol in de afbraak en opbouw van weefsel en in de ontwikkeling van het epitheel. Het moduleren van het micro-wondmilieu hangt samen met de juiste stadia van wondgenezing. De eigenschappen van Principelle IF[®] dragen eveneens bij aan de regulering van het vochtgehalte in het micro-milieu van de wond en aan de regulering van de zuurgraad in het wondoppervlak tijdens het genezingsproces. Principelle IF[®] beschermt de wond tegen mechanisch trauma. Principelle IF[®] vormt geen belemmering voor de drainage van wondvocht.

Indicaties Principelle IF[®]

Acute wonden:

- Brandwonden
- Chirurgische wonden
- Traumatologische wonden

Overige acute wonden waar een snelle epithelialisatie gewenst is

Chronische wonden:

- Decubitus
- Caviteiten
- Ulcera cruris
- Diabetische ulcera

In samenhang met corticosteroid gebruik

Contra-indicatiesPrincipelle IF[®] kan niet worden toegepast bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor Ionogene Formulering of honing.**Gebruiksaanwijzing**

Aanbrengen:

1. Inspecteer de wond zorgvuldig.
2. Reinig de wond volgens voorschrift.
3. Open de tube.
Als de tube al geopend of beschadigd is, beschouw Principelle IF[®] dan als niet steriel.
4. Breng Principelle IF[®] aan en zorg daarbij voor een optimaal contact met het wondbed.

Opmerking:Bij vochtige of nattende wonden kan Principelle IF[®] worden afgedekt met een absorberend verband om het exsudaat vast te houden.**Eénmalig gebruik**Principelle IF[®] is gesteriliseerd door middel van gammastraling. De steriliteit van Principelle IF[®] wordt alleen gegarandeerd voor ongeopende en onbeschadigde verpakkingen. Principelle IF[®] wondverband mag niet opnieuw worden gesteriliseerd.**Verpakking Principelle IF[®] tube**

Verpakkingsvorm	Inhoud	Bestelnummer
1 tube	10 g	PPIF-10
1 tube	15 g	PPIF-15
1 tube	20 g	PPIF-20

Bewaren:

Bewaren bij kamertemperatuur, droog en niet in het volle licht.



Voor éénmalig gebruik



Steriel (Gamma)



Droog bewaren



Niet in het volle licht bewaren

Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is of reeds geopend voor gebruik.