

Description of device & contents

Silken™ Silicone stoma gel

INTENDED USE: Protective gel for use around stomas & fistulas.**INSTRUCTIONS FOR USE**

Silken™ gel is used to fill uneven skin surfaces.

1. To open the tube. Unscrew the cap. Puncture the tube closure with the reverse side of the cap.
2. Ensure the skin is clean and dry.
3. Squeeze the silicone gel from the base of the tube, to fill depressions and skin contours.
4. If required spread the gel with a wetted finger, or spatula.
5. Apply the ostomy wafer or pouching system directly onto the silicone gel.
6. Silken™ gel will cure underneath the wafer / base plate during normal wear time.

REMOVAL

1. Gently peel the wafer or pouching system from the body.
2. Peel the silicone gel from the skin surface. The gel may peel off with the wafer or pouching system.

Caution:

For external use only.

Do not apply into an open wound or skin ulcer.

Avoid contact with eyes.

Should peristomal skin irritation occur, discontinue use and consult a healthcare professional.

**Description et contenu du dispositif**

Gel de silicone Silken™ pour stomie

USAGE PRÉVU: Gel de protection pour une utilisation autour des stomas et des fistules.**MODE D'EMPLOI**

Le gel Silken™ est utilisé pour assurer l'étanchéité des surfaces de peau inégales.

1. Pour ouvrir le tube. Dévissez le bouchon. Percez l'ouverture du tube avec l'arrière du bouchon.
2. Veiller à ce que la peau soit propre et sèche.
3. En pressant la base du tube, appliquez le gel de silicone pour combler les dépressions et les contours irréguliers de la peau.
4. Si nécessaire, étalez le gel avec un doigt humidifié ou une spatule.
5. Appliquez la stomie ou la poche de stomie directement sur le gel de silicone.
6. Le gel Silken™ se solidifie sous la stomie ou la poche de stomie pendant le temps normal d'utilisation.

RETRAIT

1. Décollez délicatement le système de stomie ou la poche de stomie du corps.
2. Décollez le gel de silicone de la surface de la peau. Le gel peut se décoller avec la stomie ou la poche de stomie.

Attention:

Pour usage externe uniquement.

Ne jamais appliquer sur une plaie ouverte ou un ulcère de la peau. Évitez tout contact avec les yeux. En cas d'irritation cutanée, cessez toute utilisation et consultez un professionnel de la santé.

**Hilfsmittelbeschreibung & Inhalt**

Silken™ Stoma-Silikongel

VERWENDUNGSZWECK: Schützendes Gel zur Anwendung um Stomata & Fisteln.**GE BRAUCHSANLEITUNG**

Silken™ Gel wird verwendet, um unebene Hautoberflächen auszufüllen.

1. Zum Öffnen der Tube Kappe abschrauben. Verschluss der Tube mit der Oberseite der Kappe durchstechen.
2. Haut muss sauber und trocken sein.
3. Silikongel auf Tubenende heraus drücken, um Hautvertiefungen und Hautkonturen auszufüllen.
4. Falls nötig, Gel mit angefeuchtetem Finger oder Spachtel verteilen.
5. Stomascheiben- oder Stomabeutelsystem direkt auf dem Silikongel platzieren.
6. Silken™ Gel hält während der normalen Tragezeit unter der Scheibe / Basisplatte aus.

ENTFERNEN

1. Scheiben- oder Beutelsystem vorsichtig vom Körper abziehen.
2. Silikongel von Hautoberfläche abziehen. Das Gel löst sich eventuell zusammen mit dem Scheiben- oder Beutelsystem ab.


VORSICHT:

Nur zum externen Gebrauch.

Nicht auf offenen Wunden oder Hautgeschwüren anwenden.

Kontakt mit Augen vermeiden.

Sollten Hautirritationen auftreten, Verwendung abbrechen und medizinisches Fachpersonal aufsuchen.



Silken™ - silicone stoma gel

REF TR 1070

REF TR 1071



MADE IN UK



Restoration Barn, Gargrave Road
 Skipton, N. Yorkshire BD23 3AH UK
 Tel: +44(0)1756 700599

TrioOstomyCare.com

Beskrivning av anordning och innehåll
Silken™ Silikon stomaigel

AVSEDD ANVÄNDNING: Skyddande gel för användning runt stomata och fistlar.

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Silken™ gel används för att fylla ojämna hudtyper.

- För att öppna röret. Skruva av locket. Punktera rörtoppen med lockets andra sida.
- Se till att huden är ren och torr.
- Kläm ut silikongelen från tubens bakre ände för att fylla depressioner och hudkonturer.
- Om det behövs, sprid gelen med ett vätt finger eller en spadel.
- Aplicera stomiplatten eller påssystemet direkt på silikongelen.
- Silken™ gel kommer att hålla under plattan / basen under normal användningstid

AVLAGSNANDE

- Skala försiktig bort plattan eller pås-systemet från kroppen.
- Skala bort silikongelen från hudytan. Gelen kan följa med plattan eller pås-systemet.

Försiktighet:

Endast för utvärtes bruk.

Aplicera inte in i ett öppet sår eller hudulcer.

Undvik kontakt med ögonen.

Om peristomal hudirritation uppkommer, sluta använda och konsultera hälsovårdspersonal.

Beskrivelse av enheten og innholdet
Silken™ Silikonstoma-gel

BRUKSMÅRÅDE: Beskyttende gel til bruk rundt stomi og fistler.

BRUKSANVISNING

Silken™ gel brukes til å fylle inn ujevnheter i huden.

- Før at åpne tuben. Skru av lokket. Stikk hull i enden av huden med undersiden av dekslet.
- Pass på at huden er ren og tørr.
- Klem Silken™-gel fra nederst på tuben, for å fylle ut fordybninger og hudkonturer.
- Om nødvendig, spre gelen utover med en fuktet finger, eller spadel.
- Sett ostomiskiven eller posessystemet direkte over silikongelen.
- Silken™ gel vil herdes under skiven will / bunnplassen under normal brukstid.

FJERNING

- Trekk skiven eller posessystemet forsiktig fra kroppen.
- Trekk silikongelen fra hudoverflaten. Gelen kan trekkes av med skiven eller posessystemet.

Forsiktig:

Kun til utvändig bruk.

Må ikke brukes på et åpent sår.

Unngå kontakt med øynene.

Hvis peristomal hudirritasjon oppstår, slutt å bruke og ta kontakt med helsepersonell.

Beskrivelse af anordning og indhold
Silken™ stoma-gel af silikone

TILSIGTET ANVENDELSE: Beskyttende gel til anvendelse omkring stomen & fistler.

BRUGSANVISNING

Silken™ gel anvendes til at fyde ujevnheder i hudens overflade.

- For at åbne tuben: skru låget af. Punkter tubens forsegling med den anden side af tubens låg.
- Sørg for, at huden er ren og tør.
- Klem silikone-gelen fra bunden af tuben for at fyde fordybninger og ujevnheder i huden.
- Hvis det er nødvendigt, kan du fordele gelen med en våd finger eller en spadel.
- Placer stomi-pladen eller stomiposessystemet direkte på silikone-gelen.
- Silken™ gel vil fastsætte sig under stomi-pladen, mens den anvendes.

AFTAGNING

- Tæk forsigtigt stomi-pladen eller stomiposessystemet væk fra kroppen.
- Tæk silikone-gelen fra huds overflade. Gelen vil muligvis trækkes af sammen med stomi-pladen eller stomiposessystemet.

Advarsel:

Kun til udvortes brug.

Må ikke anvendes på et åbent sår eller hudirritation.

Undgå kontakt med øjnene.

Hvis peristomal hudirritation skulle opstå, skal du stoppe anvendelse og kontakte din læge.

Tuotekuvaus ja sisältö
Silken™ Silikonigeeli avanteeseen

KÄYTÖTÄRKOKOITUS: Suojaava geeli, jota käytetään avanteiden ja fistileiden ympäriä.

KÄYTÖTÖHJE

Silken™ geeli käytetään täytäntämän epätasaiset pinnat iholla. 1. Avaa putkilo. Kierrä korkki auki. Lävistä putkilon pää korkin kääntöpuolella.

2. Varmista, että iho on pulhas ja kuiva.

3. Purista silikonigeelia ulos putkilon pohjasta ja täytä siltä iho painauksia ja säärivärit.

4. Levitä geeli tarvitessa kostutettua sormella tai lastalla.

5. Aseta avanteen pohjalevy tai avanneepussi suoraan silikonigeelin päälle.

6. Silken™-geeli hoitaa pohjalevyn alla olevaa ihoa normaalilin käytötojan puitteissa.

IRROTTAMINEN IHOLTA

- Irrota pohjalevy tai avanneepussi varovasti paikaltaan.
- Kuori silikonigeeli ihan pinnalta. Geeli voi irtauttaa pohjalevyn tai avanneepussin mukana.

Varoitus:

Vain ulkoiseen käyttöön.

Älä levitä avoimeen haavaan tai ihoon haavumaan.

Valta geelin joutumista silmiin.

Jos avanteen ympäällä oleva iho ársyntyy, keskeytä tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkärin.

Descrição do dispositivo e conteúdo
Gel para estomas de silicone Silken™

UTILIZAÇÃO PREVISTA: Gel de protecção para utilização à volta de estomas e fistulas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O gel Silken™ é utilizado para preencher superfícies da pele irregulares.

- Para abrir o tubo. Desaperte a tampa. Perfure o tampão do tubo com o lado contrário da tampa.
- Assegure-se de que a pele está limpa e seca.
- Aparte o gel de silicone a partir da base do tubo, para preencher depressões e contornos da pele.
- Se necessário, espalhe o gel com um dedo molhado ou com uma espatula.
- Aplique o disco de ostomia ou o sistema de bolsa directamente sobre o gel de silicone.
- O gel Silken™ vai enduzer por baixo do disco/placa da base durante o tempo de utilização normal.

REMOÇÃO

- Retire cuidadosamente do corpo o disco ou o sistema de bolsa.
- Retire o gel de silicone da superfície da pele. O gel pode sair juntamente com o disco ou o sistema de bolsa.

Atenção:

Apenas para uso externo.

Não aplicar numa ferida aberta ou úlcera cutânea.

Evitar o contacto com os olhos.

Se ocorrer irritação da pele periestomal, interrompa a utilização e consulte um profissional de saúde.

Popis náčiní a obsahu

Silken™ silikonový stomační gel

NAVRHOVANÉ UŽITÍ: Ochranný gel k použití kolem stomí a vývodů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Silken™ gel se používá k vyplnění nerovností na pokožce.

- Pro otevření tuby odšroubujte uzávěr a prorazte otvor tuby opačnou stranou uzávěru.
- Ujistěte se, že je pokozka čistá a suchá.
- Vytláčte silikonový gel odsodu tuby k vyplnění prohlubnin a kožních okrajů.
- Poddle potřebuje rozebrat gel navlhčeným prstem nebo špačtičkou.
- Aplikujte stomační podložku nebo sáčkový systém přimo na silikonový gel.
- Silken™ gel zůstane pod podložkou během běžné doby nošení.

ODSTRANĚNÍ

- Jemně odlepte podložku nebo sáčkový systém z těla.
- Sloupňte silikonový gel z pokožky. Gel se někdy odlepí spolu s podložkou nebo sáčkovým systémem.

Varování:

Pouze k vnějšímu užití.

Neaplíkujte na otevřené rány nebo kožní vředy.

Zamezte vniknutí do oka.

Pokud dojde k podráždění peristomální pokožky, přeruďte používání přípravku a poraďte se s lékařem.

Περιγραφή εξοπλισμού & περιεχομένων

Silken™ γελ οιλικόνης για στομία

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Προστατευτική γέλη για χρήση γύρω από στομίες & συριγία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η γέλη Silken™ χρησιμοποιείται για να γεμίζει ακανόνιστες επιφάνειες δέρματος.

- Για να ανοίξετε το σωληνάριο. Ξεβιδώστε το καπάκι. Τρυπήστε το κλειστό σωληνάριο με την ανάτομη πλευρά από το καπάκι.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιδερμίδα είναι στεγνή και καθαρή.
- Βγάλτε πάντως τη γέλη οιλικόνης από τη βάση του σωληναρίου, για να γεμίσετε κοιλότητες και περιγράμματα επιδερμίδας.
- Αν είναι απαραίτητο απλώστε τη γέλη με ωντό δάκτυλο ή με μια σπάτουλα.
- Εφαρμόστε το δίσικο στομίας ή το σύστημα σάκου άμεσα πάνω στη γέλη οιλικόνης.
- Η γέλη Silken™ θα δρά κάτω από το δίσικο / δίσικο βάσης κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

- Αφαιρέστε απαλά το δίσικο ή το σύστημα με το σάκο από το σώμα.
- Εφαρμούστε τη γέλη οιλικόνης από την επιφάνεια της επιδερμίδας. Η γέλη μπορεί να αποκολληθεί μαζί με το δίσικο ή το σύστημα σάκου.

Προσοχή:

Μόνο για εξωτερική χρήση.

Μην εφαρμόσετε σε μια ανοιχτή πληγή ή σε ένα επιδερμικό έλκος.

Απορύγευτε την επιφάνεια με τα μάτια.

Προσοχή: Αν οημεωθεί ερεθίσμας της επιδερμίδας γύρω από τη στομία, σταματήστε την χρήση και συμβουλευτείτε ιατρό.

trio ostomy care™

Silken™ – silicone stoma gel

REF TR 1070

REF TR 1071

TrioOstomyCare.com